

Mode d'emploi Green Agron®

MODE D'EMPLOI	pédiluve	1 ^{er} mois	2 ^{ème} mois	3 ^{ème} mois
Green Agron	solution * à	15%	15%	10%
	pour 150 vaches	22,5 kg/150 L	22,5 kg/150 kg	15 kg/150 L
	pour 200 vaches et +	100 à 150 kg/850 à 900 L		
	passages/semaine	3	2	2
	litre de solution/vache	1		
	zones de circulation **	100 gr/ m ²		
Red Agon	pulvérisation/jour	1	régulière	régulière

* solution non réutilisable

** Elimination du biofilm, rend la surface non glissante


Précautions d'emploi : ne pas utiliser de produit nettoyant simultanément (impératif)

Incompatible avec des produits alcalins en pédiluve, logettes, aires de repos (chaux vive)

Comment dissoudre Green Agron dans le pédiluve:

- Remplir le pédiluve avec de l'eau chaude (30-60°C) pour faciliter la dissolution de l'Agron. (NE JAMAIS mettre l'Agron en premier lieu et l'eau ensuite).
- Epancher la moitié du volume d'Agron sur la surface de l'eau et agiter énergiquement jusqu'à dissolution du produit. Ajouter la seconde moitié de l'Agron sur la surface de l'eau et mélanger à nouveau (pour éviter la formation de précipitats)
- 30 minutes après dissolution de 95 % d'Agron le pédiluve est prêt. Une petite fraction d'Agron ne sera

pas dissoute du fait de la présence d'un antiagglomérant. En cas de mélange à l'eau froide une agitation énergique est nécessaire. Préparer le mélange idéalement 6 à 8 heures avant usage. Si un précipité se forme, l'Agron n'a pas été dissout correctement et la solution doit être jetée.



Mode d'emploi Red Agron®

Application

Utiliser pur et quotidiennement sur les zones à problèmes à l'aide d'un pulvérisateur à dos ou à main ou en robot de traite. Appliquer une fine couche de Red Agron de façon à bien couvrir la zone à traiter et les abords. La peau et les poils de la zone atteinte doivent être imbibés de Red Agron.


Recommandations

Il est recommandé d'utiliser à la fois Red Agron et Green Agron. L'efficacité de Red Agron peut prendre plusieurs semaines. Si la croûte de la plaie devient noire, cela indique une utilisation correcte de Red Agron et que la guérison a commencé – Ne pas retirer la croûte.



Effet de l'Agron sur la dermatite digitée (DD)

Essai réalisé dans une université indépendante comprenant 389 vaches laitières SDM provenant de 4 exploitations laitières Danoises en 2011 par Jan van Wyhe-Storgaard – Biochimiste.



Réduction de la dermatite digitée avec le traitement à l'Agron après 30 et 60 jours.

	Réduction de la dermatite digitée au 30ème jour	Réduction de la dermatite digitée au 60ème jour
lésion précoce DD*	- 88 %	- 97 %
lésion aiguë DD*	- 54 %	- 86 %
lésion chronique DD*	- 69 %	- 89 %

La baisse du nombre de DD est exprimée en % du nombre de DD avant traitement à l'Agron.(Jour 0)



AVANT

Le début du traitement avec Agron la lésion a été lavée pour visualiser l'aspect caractéristique du syndrome dermatite digitée.



APRÈS

Après un traitement de 2 semaines à l'Agron une croûte sombre recouvre la plaie et la guérison commence.